

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 120 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. - CCP DIJON



☎ 80.22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 5 - 19 mars 1986

COLZA

- Charançons de la tige : *des traitements sont à envisager*
- Cylindrosporiose : *les symptômes sont peu fréquents*

COLZA

Les dégâts dus aux conditions de l'hiver varient beaucoup selon les parcelles. Ils se traduisent surtout par des destructions de petits pieds (2-4 feuilles) à la suite d'un déchaussement. Les décisions de retournement doivent être prises actuellement (selon les indications du bulletin précédent).


La reprise de végétation ne fait que commencer dans les situations les plus en avance. Celles-ci sont difficiles à localiser car elles diffèrent selon les parcelles ; situation géographique, type de sol, variété, type de peuplement (reprise plus marquée pour les gros pieds que pour les petits pieds).

CHARANCONS DE LA TIGE

GENERALITES :

- L'identification des insectes nécessite leur séchage (papier buvard, mouchoir en papier).

Le charançon de la tige du colza
dangereux



Longueur : 2,6 à 4,0 mm
Couleur : gris foncé

* pattes noires

(* caractéristiques visibles à la loupe de poche)

Dégâts : Les piqûres de ponte faites sous le bourgeon terminal provoquent des torsions et éclatements de tige.

Le charançon de la tige du chou



2,5 à 3 mm (un peu plus petit)
gris clair
une tache blanche sur le dos
* bout des pattes roux

Pas de dégâts

P.4.13

- La période sensible du colza va de la reprise de végétation au stade "hauteur de la tige à 20 cm".
- Les conditions d'intervention selon l'activité de l'insecte sont les suivantes :
 - . si des captures répétées, même faibles en nombre
 - (ou) . si des captures importantes (quelques dizaines) en une seule fois,
 - (ou) . si présence d'une piqûre de ponte par pied en moyenne (comptage sur 25-50 pieds) cette observation est difficile à faire, mais elle peut compenser la mise en place tardive d'une cuvette.

SITUATION - PREVISION :

- Pas de capture dans le Nord de l'Yonne (Jovinien, Sénonais)
Des captures parfois très importantes sont notées depuis le 16/03 dans tout le reste de la Circonscription.
Elles concernent surtout le charançon de la tige du colza, mais également le charançon de la tige du chou dans le Jura et la Haute-Saône.
- La période de ponte va débiter à partir du 25-27 mars environ.

PRECONISATIONS :

- Dans le Nord de l'Yonne, ne pas envisager de traitement dans l'immédiat.
- Dans le reste de la Circonscription, des applications insecticides sont à prévoir à partir du 25 mars.
Les spécialités autorisées pour cet usage sont les suivantes : *alphaméthrine* (Fastac 0,5 l par ha) ; *cyperméthrine* (Cymbush - Kafil 0,25 l par ha) ; *deltaméthrine* (Décis 0,3 l par ha) ; *phosalone* 1200 g par ha ; *parathion* 300 g par ha ; *méthidathion* 300 g par ha ; *lindane* 300 g par ha ; *endosulfan* 400 g par ha.
Préférer les spécialités du type pyréthrianoïde.


— CYLINDROSPORIOSE

SITUATION ACTUELLE :

Les symptômes sont très peu fréquents, et dans la majorité des cas ils sont notés sur les feuilles externes de la variété Jet Neuf.

PRECONISATION :

Ne pas envisager de traitement fongicide dans l'immédiat.



ATTENTION ! Dernier bulletin si vous n'êtes pas réabonné
